

OISEAUX NOUVEAU-NÉS (première étape)

PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA PÂTÉE

L'élevage à la main doit nous permettre élever nos oiseaux avec autant de succès que leurs parents et d'obtenir des résultats similaires. Il paraît évident qu'une attention correcte aux besoins de nos oiseaux dans chacune des étapes de leur développement est fondamentale pour l'obtention de croissances appropriées. Mais s'il faut souligner une des étapes de l'élevage manuel, celle-ci est bien l'étape néonatale.

Le critère de base auquel nous devons faire cas dit que les animaux **doivent gagner du poids depuis leur premier jour de vie**. Une croissance correcte pendant ces premiers jours de vie achemine les animaux vers une tendance à la croissance exponentielle, qui est la base de la croissance correcte des poussins. Les oiseaux peuvent doubler leur poids au bout de trois jours de vie et tripler leur poids au bout de six jours. La courbe de croissance de ces premiers jours est une courbe très verticale.

Afin que ceci se produise, il est nécessaire de disposer d'un produit avec une haute concentration aussi bien en protéines comme en énergie (graisse). Le *lait de jabot* est un produit qui accomplit cette fonction. Son utilisation est recommandée pour tout type d'espèce nidicole pendant les premiers jours de vie, variable selon l'espèce à élever. Par exemple, pour élever les Gris du Gabon nous recommandons son utilisation pendant 7 jours comme diète unique et 5 jours de plus mélangé avec une diète moins concentrée. En ce qui concerne les Aras il est recommandable prolonger un peu plus son utilisation exclusive. Au contraire, pour les oiseaux plus petits et à croissance plus rapide, il est préférable réduire un peu le temps de son utilisation.

Le *lait de jabot* est un produit exclusif de très haute digestibilité. Ceci en fait un produit apte pour d'autres utilisations: soins d'oiseaux hospitalisés, alimentation temporaire d'oiseaux à transit digestif lent...

SOINS DES NOUVEAU-NÉS DE GRIS DU GABON

Nous donnerons la première prise lorsque le poussin manifestera le réflexe de déglutition. Habituellement, ceci a lieu une ou deux heures après leur naissance. Recommandation: *Liquide de Ringer* saupoudré de *lait de jabot*.

Ils doivent être nourris toutes les 2 ou 3 heures. Ainsi, nous donnerons 8 prises de pâtee par jour et nous respecterons le repos nocturne des poussins et de l'éleveur. Voici un exemple horaire: 7h - 9h - 11h - 13h - 16h - 18h - 21h - 24h. Nous maintiendrons les 8 prises jusqu'à ce qu'il atteigne les 5 jours.

Dans les premières 8 prises de pâtee, nous concentrerons progressivement la base de *Liquide de Ringer* mélangée avec le *lait de jabot* à chaque prise, jusqu'à obtenir une concentration du 20% ce même premier jour de vie, et du 25% à partir du deuxième jour de vie. La pâtee a une texture semblable à celle d'un yaourt bien mélangé. Arrivés à ce stage il n'est plus nécessaire utiliser le *Liquide de Ringer*, pouvant réaliser la dilution avec de l'eau.

À partir du jour 7 nous diminuerons la quantité de pâtees données. Nous proposons 6 prises jusqu'au jour 14. L'exemple horaire serait ainsi: 7h - 10h - 13h - 17h - 20h - 23h. Dans cette phase nous mélangerions le *lait de jabot* avec une pâtee moins concentrée. Dans le cas du perroquet gris, il s'agirait de *PSITTACUS Néonatale*.

