

## PSITTACIDÉS ENFANTS ET JEUNES

### PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA PÂTÉE DE CONTINUATION

Pendant la phase de croissance des poussins enfants, les perroquets augmentent leur poids plus lentement que pendant l'étape néo-natale, jusqu'à atteindre leur poids le plus élevé. Avec l'introduction de la nourriture solide et la diminution des pâtées au début de l'étape jeune, les perroquets perdent un peu de poids jusqu'à la stabilisation du poids qu'ils auront approximativement lorsqu'ils seront adultes.

La pâtée *PSITTACUS Haute Énergie*, la pâtée *PSITTACUS Haute Protéine* et la pâtée *PSITTACUS Mini* sont des pâtées de continuation. Elles doivent être utilisées à partir du moment où les premières plumes des ailes épointent, et elles peuvent être données jusqu'à l'émancipation du perroquet.

**Nous recommandons donner les pâtées avec une concentration solide du 25%. Pour cela, nous préparerons la pâtée en ajoutant 3 parts d'eau (en poids) à chaque part du produit.** La texture que nous obtiendrons sera similaire à celle d'un yaourt bien mélangé. Avec ce niveau de concentration nous pourrions atteindre un maximum de profit des nutriments, une hydratation optimale du poussin et une vitesse de transit digestif exceptionnelle. La pâtée ainsi préparée, bien qu'elle présente une texture fluide, est extrêmement riche en nutriments et produit une croissance excellente sans besoin de trop remplir le jabot. Une majeure concentration solide n'apportera point d'avantages ajoutés, mais bien au contraire, elle peut ralentir le vidage du jabot et produire une excessive sensation de satiété.



## SOINS DES GRIS DU GABON ENFANTS ET JEUNES

- À partir des 28 jours de vie, nous devons donner à notre jaco la pâtée *PSITTACUS Haute Énergie*. On lui donnera 4 pâtées par jour jusqu'aux 50 jours de vie.
- Atteint ce point (50 jours), nous réduirons les prises à 3 pâtées par jour. En même temps, nous introduirons la nourriture solide. Nous commencerons à mettre à leur disposition l'extrudé *PSITTACUS Omega*, puis des fruits et des légumes frais.
- Atteints les 75 jours, nous devons réduire à nouveau d'une prise (2 prises par jour). Nous recommandons annuler la prise de midi et continuer avec la prise matinale et de l'après-midi/soir. Nous mettrons alors de l'eau à sa disposition.
- Atteints les 90 jours, nous réduirons les prises à 1 par jour. Nous maintiendrons préférentiellement celle de l'après-midi/soir.
- Nous annulerons complètement les prises de pâtée lorsque le jaco atteindra les 4 mois de vie.

