

PSITÁCIDOS INFANTILES Y JUVENILES

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LAS PAPILLAS

Durante la etapa de crecimiento infantil, los loros aumentan de peso más lentamente que en la etapa neonatal, hasta conseguir el punto más alto de peso. Con la introducción del alimento sólido y la disminución de las papillas, al inicio de la etapa juvenil pierden un poco de peso hasta estabilizarse en el peso que van a tener aproximadamente de adultos.

La papilla *PSITTACUS Alta Energía*, la papilla *PSITTACUS Alta Proteína* y la papilla *PSITTACUS Mini* son papillas de continuación. Deben ser utilizadas a partir del momento en que empiezan a despuntar las primeras plumas de las alas y se puede utilizar hasta la emancipación del loro.

Recomendamos suministrar las papillas en una concentración de sólidos del 25%. Para ello prepararemos la papilla añadiendo 3 partes de agua (en peso) por cada parte de producto. Estableceremos las proporciones pesando ambos componentes. La textura que conseguiremos será parecida a la de un yogur batido. Con este nivel de concentración lograremos maximizar el aprovechamiento de los nutrientes, una óptima hidratación del polluelo y una inmejorable velocidad de tránsito digestivo. La papilla así preparada, aunque su textura fluida no lo aparente, es extremadamente rica en nutrientes y da lugar a crecimientos excelentes sin tener necesidad de sobrellenar los buches. Una mayor concentración de sólidos no aportará ninguna ventaja añadida, en cambio, puede ralentizar el vaciado del buche y provocar una excesiva sensación de saciedad.



ATENCIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN LOROS GRISES

- A partir de los 28 días de vida debemos suministrar a nuestro yaco la papilla *PSITTACUS Alta Energía*. Les ofreceremos 4 papillas al día hasta los 50 días de edad.
- En ese momento (50 días) vamos a reducir una toma de papilla, suministraremos 3 papillas al día. Simultáneamente, introduciremos la alimentación sólida. Empezaremos a ponerles a disposición pienso *PSITTACUS Omega* y fruta y verdura frescas.
- Alrededor de los 75 días debemos reducir de nuevo una toma (suministraremos 2 papillas al día). Recomendamos retirar la toma del mediodía y dejar la toma de la mañana y la de la tarde/noche. Entonces pondremos agua a disposición del loro.
- A los 90 días, reduciremos la toma de la mañana. Suministramos 1 sola papilla al día. Recomendamos darla al anochecer.
- Retiraremos completamente la papilla a los 4 meses de edad del yaco.

